

n° 23

18 août 2020

## Cultures fruitières



### À retenir cette semaine

**PROCHAIN BSV : Mardi 01 septembre 2020 (parution tous les 15 jours en été)**

- **Fruits à noyau :**
  - **Forficules :** Présence de dégâts.
- **Pêcher-abricotier :**
  - **Tordeuse orientale :** Le vol diminue mais toujours en cours.
  - **Maladies de conservation :** Dégâts sur pêches.
  - **Bactériose à *Xanthomonas* :** Taches visibles sur pêcher.
- **Abricotier :**
  - **Coryneum :** Restez vigilants. Risque de pluie en fin de semaine.
  - **Anarsia :** Le vol se termine.
  - **ECA :** Présence de symptômes.
  - **Rouille :** Présence de symptômes sur abricotier et pêcher.
- **Pêcher :**
  - **Cicadelle verte :** Présence forte d'individus, et dégâts visibles. Risque élevé cette semaine.
  - **Thrips californien :** Présence d'individus. Risque élevé cette semaine.
- **Cerisier :**
  - **Coryneum, cylindrosporiose :** Risque élevé en fin de semaine.
- **Pommier-Poirier :**
  - **Tavelure :** Risque élevé en cas d'averses.
  - **Carpocapse :** Vol de G2 terminé en MVR. La G3 a débuté. Période à haut risque de ponte et d'éclosion terminées en SHS et RL.
  - **Tordeuse de la pelure :** Dégâts sur certaines parcelles.
  - **Feu bactérien :** À surveiller. Risque élevé en fin de semaine (averses possibles)
- **Pommier :**
  - **Pucerons lanigères :** Risque faible cette semaine (fragilisation par la chaleur).
  - **C. Lobarzewskii :** Vol terminé.
- **Poirier :**
  - **Psylle du poirier :** Alternance aspersion/séchage à maintenir si miellat.
- **Noyer**
  - **Carpocapse :** Capture en baisse. Vol de deuxième génération se termine.
  - **Mouche du brou :** Pas de prise cette semaine.
  - **Bactériose :** présence sur certaines parcelles. Restez vigilants en cas de conditions humides.
  - **Collectotrichum :** À surveiller Risque élevé en fin de semaine (averses possibles)
- **Châtaignier :**
  - **Tordeuse :** Vol en forte diminution (terminé en nord-Ardèche).
  - **Cynips :** Peu de galles observées
  - **Carpocapse :** Vol en cours.
- **Toutes espèces**
  - **Punaise diabolique :** Fortes attaques en SHS sur parcelles hors réseau.
  - **Ambroisie :** Période floraison.
  - **Cératite :** Capture sur une parcelle du réseau.
  - **Cicadelle pruineuse :** Présence d'individus. Risque élevé en cas de fortes chaleurs.



Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture, Réseau FREDON Auvergne - Rhône-



Ce BSV est réalisé à partir des observations effectuées le lundi 17 août par les observateurs sur les parcelles de référence non récoltées.

## FRUITS À NOYAU

### • FORFICULES—*Forficula auricularia*

**Situation :** Des dégâts ont été observés sur 2 parcelles de pêchers lors des observations à l'approche de la récolte en Moyenne Vallée du Rhône le 17 août, avec 1 % et 6 % de fruits touchés.

**Analyse de risque :** Le risque de morsure sur fruits débute au moment de la maturation. Il devient de plus en plus élevé à l'approche de la maturité.

 **Méthode alternative :** Les forficules causent des morsures sur les fruits en maturation, formant des portes d'entrée pour le développement de champignons, et l'installation d'insectes tels que les drosophiles. **La pose d'une barrière engluée au niveau des troncs est une méthode efficace pour empêcher la remontée des adultes vers les fruits en développement (à mettre en place au moins un mois avant la récolte).** En complément, il est important d'éliminer les branches touchant le sol, et les rejets qui constituent des ponts de passage pour les forficules, pour contourner l'anneau de glu. Attention à la gestion de l'enherbement qui peut former par endroit des ponts de passage pour l'insecte.


## PÊCHER – ABRICOTIER

De nombreuses parcelles d'abricotiers du réseau sont désormais récoltées.

### • TORDEUSE ORIENTALE – *Cydia molesta*

**Situation :** Les relevés de piégeage réalisés le 17 août montrent que le vol est en diminution par rapport aux semaines précédentes. Restez vigilants car les captures peuvent rester importantes sur certaines parcelles en Moyenne Vallée du Rhône.

NB : Le nombre de parcelles de piégeage est désormais réduit, de nombreuses parcelles de référence étant récoltées. Par ailleurs, les relevés sont réalisés toutes les 2 semaines en été d'où l'allure impactée de la courbe de vol.



Résultats des suivis de TORDEUSES ORIENTALES du 17/08/2020 sur abricotier						
Secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
MVR	1	1	0	0	0	0

Résultats des suivis de TORDEUSES ORIENTALES du 17/08/2020 sur pêcher						
Secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
MVR	4	2	0	0	1	1
RL	1	0	0	1	0	0

## • MALADIES DE CONSERVATION

**Biologie :** Cf. Biologie et photos dans BSV n°18 du 16/06/20

**Situation :** Les observations réalisées le 10 et 17 août à l'approche de la récolte ont montré la présence de moniliose sur 3 parcelles de pêcheurs de Moyenne Vallée du Rhône. De 12 à 20 % des fruits sont concernés par des pourritures.

**Analyse de risque :** Une vigilance doit être mise en œuvre au moment de la maturation. Les blessures (microfissures, cracking, morsures de forficules etc.) doivent être prises en compte car elles constituent des portes d'entrée pour les champignons. **Les conditions climatiques orageuses prévues cette fin de semaine pourraient être favorables au champignon.**

## • MALADIE DES TACHES BACTÉRIENNES – *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*

**Biologie :** Pour rappel, la pression de la maladie est forte depuis plusieurs années en Moyenne Vallée du Rhône, avec l'observation de symptômes sur pêcheurs mais également sur abricotiers. Les températures chaudes sont favorables à la multiplication de la bactérie, la pluie et le vent sont nécessaires pour sa dissémination. **A 15°C, il faut environ 7 heures d'humectation pour entraîner une contamination, et environ 5 heures d'humectation à plus de 20 °C.**

**Situation :** Les observations réalisées le 10 et 17 août à l'approche de la récolte ont montré la présence de la maladie sur 1 parcelle de Moyenne Vallée du Rhône. 0,5% des fruits était concernés par des dégâts.

**Analyse de risque :** Soyez vigilants, en particulier dans les parcelles attaquées les années précédentes (concerne surtout la Moyenne Vallée du Rhône où la maladie est problématique).

**Le temps humide prévu en fin de semaine est favorable à la propagation de la bactérie. Soyez également vigilants en cas d'irrigation (à plus de 20°C, 5 heures d'humectation suffisent aux contaminations).**

**Prophylaxie :** Il est indispensable de mettre en œuvre des mesures prophylactiques dans les zones à risque (source Groupe de Travail *Xanthomonas*)

- Intervenir dans les parcelles saines d'abord, celles ayant présenté des symptômes ensuite.
- En fin de travail dès la sortie de parcelle, nettoyer le matériel de tous déchets végétaux (feuilles, fruits, rameaux) et encroûtements de sève sur les sécateurs, les désinfecter et les remiser au sec jusqu'au lendemain.
- Irriguer avec modération, en fonction du besoin. Ne pas arroser trop tôt.
- Éviter les excès d'azote, et les déficits potassiques, se contenter d'une vigueur moyenne mais correcte
- Lors de l'établissement de jeunes vergers, éviter les systèmes d'irrigation mouillant le bas du feuillage et proscrire l'aspersion sur frondaison, à éviter absolument.

⇒ **Signaler au SRAL Rhône-Alpes ou à votre technicien toute nouvelle parcelle suspecte.**

## • TAVELURE – *Cladosporium carpophilum*

**Biologie :** Cf. BSV n° 06 du 2/03/2020

**Situation :** Aucun symptôme n'a été trouvé lors des observations du 17 août.



Tavelure sur abricot - Photo CA07

**Analyse de risque :** la Tavelure du mirabellier ou bien Tavelure noire du pêcher peut s'attaquer aux pêchers, pruniers (surtout mirabelliers), et plus rarement aux abricotiers (Hargrand, Bergeron très sensible). Le risque concerne les parcelles touchées les années précédentes, en particulier en Moyenne Vallée du Rhône (maladie rare en Rhône-Loire). **Les conditions climatiques orageuses prévues cette fin de semaine pourraient être favorables à la maladie.** Pour rappel, plus de 6 heures d'humectation à 20°C sont favorables aux contaminations, sachant que la période estivale est une période à haut risque.



**Prophylaxie :** favoriser l'éclaircissement et l'aération des arbres par la taille.



## ABRICOTIER


De nombreuses parcelles d'abricotiers du réseau sont désormais récoltées.

### • PETITE MINEUSE DU PÊCHER – *Anarsia lineatella*

**Situation :** Les prises sont faibles. Le vol se termine.

Résultats des suivis d'ANARSIA du 17/08/2020 sur abricotier

Secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 30 captures	Nombre de pièges avec plus de 30 captures
MVR	1	1	0	0	0	0
RL	3	2	1	0	0	0



NB : Le nombre de parcelles de piégeage est désormais réduit, de nombreuses parcelles de référence étant récoltées. Par ailleurs, les relevés sont réalisés toutes les 2 semaines en été d'où l'allure impactée de la courbe de vol.

**Analyses de risque :** En dessous du seuil de 30 captures, le risque d'attaque est faible.

## • MALADIE CRIBLÉE—*Coryneum beijerinckii*

**Biologie :** Le champignon se conserve sous forme de mycélium dans les organes atteints et les conidies se forment au printemps, en conditions de températures comprises entre 9°C et 27°C (avec un optimum entre 19°C et 23°C). Elles peuvent infecter les jeunes organes dès leur formation à la faveur des pluies. Une mauvaise aération du verger avec des arbres très serrés et peu taillés sont des facteurs favorisant.

**Situation :** Aucun dégât sur fruits n'a été observé à l'approche de la récolte.

**Analyse de risque :** les conditions météorologiques sèches annoncées cette semaine ne sont pas favorables aux infections.

## • BACTÉRIOSES À *PSEUDOMONAS*

**Situation :** Aucun symptôme n'a été visible en Moyenne Vallée du Rhône et Rhône-Loire lors des observations réalisées à l'approche de la récolte. À noter que les symptômes sur fruits peuvent être confondus avec les taches de corynéum (vérifier la présence de criblures sur feuilles pour le diagnostic).

**Analyse de risque :** les blessures constituent une porte d'entrée pour les bactéries. Les conditions orageuses prévues en fin de semaine pourraient être favorables à leur pénétration.

**Prophylaxie :** Au retour d'un temps sec, supprimer les parties attaquées, en veillant à bien désinfecter les outils entre chaque arbre ou au moins entre chaque parcelle. Cf. également paragraphe Prophylaxie dans Toutes Espèces du BSV n°02 du 25/02/20 et la Fiche technique n° 1 du Guide Ecophyto Fruits disponible avec le lien : <https://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto>

## • ENROULEMENT CHLOROTIQUE DE L'ABRICOTIER

**Situation :** Pendant l'été, les symptômes se présentent sous forme de feuilles de petite taille qui s'enroulent en « cuillère » et qui se décolorent entre les nervures. **Ces symptômes sont visibles sur des parcelles hors réseau en Moyenne Vallée du Rhône.**



**Analyse de risque et mesures de lutte :** Actuellement, nous ne sommes pas en période de risque de contamination par le vecteur *Cacopsylla pruni* (risque nul). Nous sommes dans une période favorable à l'observation car les symptômes estivaux sont repérables.

## • ROUILLE DU PRUNIER – *Tranzschelia pruni-spinosae*

**Biologie :** Cf. Biologie dans BSV n°15 du 26/05/20

**Situation :** Des symptômes (en face inférieure, apparition de taches orange) sont visibles en Moyenne Vallée du Rhône. Le 17 août, la présence de rouille a été observée sur 3 parcelles de référence. De 5 à 100 % des feuilles et de 50 à 100% des arbres étaient concernés par la présence du champignon. Hors réseau, des symptômes sont également visibles sur des parcelles d'abricotiers conduites en Agriculture Biologique.



**Analyse de risque :** les conditions orageuses de cette fin de semaine sont favorables aux contaminations.

# 🌀 PÊCHER

## • CICADELLES VERTES – *Empoasca vitis*

**Situation :** Le 17 août, une forte présence d'adultes était signalée sur une parcelle du secteur Rhône-Loire avec 224 individus sur pousses. La présence de dégâts est visible dans la majorité des parcelles (crispation des feuilles qui se dessèchent).

**Lorsque les populations se développent de façon importante, elles entraînent la crispation des feuilles et persistent durant l'été entraînant parfois des dégâts conséquents.**

Nombre de parcelles de pêcher par nombre de cicadelles observées sur 40 pousses					
Observation du 17 août 2020					
Secteur	Total de parcelles suivies	Niveau de présence			
		Nul	Faible : <10 individus	Moyenne : entre 11 et 20 individus	Forte : Plus de 20 individus
RL	1	0	0	0	1

**Analyse de risque :** Le risque de développement des cicadelles restera élevé cette semaine. Soyez vigilants sur les jeunes plantations, où de fortes populations peuvent devenir problématiques dans les zones où l'insecte est habituellement observé (concerne la Moyenne Vallée du Rhône).



## • THRIPS CALIFORNIEN – *Frankliniella occidentalis*

**Biologie :** cette espèce de Thrips attaque principalement le pêcher à l'approche de la maturité des fruits. Il peut être rencontré sur de nombreuses espèces, et causer quelques dégâts sur abricotier.

On peut rencontrer d'autres espèces de Thrips, généralement inoffensives à cette époque, sur les pousses en croissance du pêcher. Les thrips californiens adultes sont de couleur marron clair, et de petite taille 1,3 à 1,4 mm, les larves de couleur blanc-crème sont de même forme mais mesurent 0.5 à 1 mm. Cf. également BSV n°18 du 16/06/20.

**Situation :** lors des observations réalisées à l'approche de la récolte, 2 parcelles de Moyenne Vallée de Rhône étaient concernées par des attaques sur fruits (de 0,5% à 1,5% de fruits touchés). Des piqûres sont également visibles hors réseau en Rhône-Loire sur variété de Nectavigne (très sensibles).



Dégâts de thrips californiens – photo SICOLY



**Analyse de risque :** Dans les parcelles avec présence, le risque restera élevé cette semaine sous l'effet des températures chaudes favorables à l'insecte. Soyez vigilants.

**Prophylaxie :** Il faut veiller à **faucher régulièrement l'enherbement** pour enlever les fleurs, et limiter ainsi les populations. Des fauches trop espacées peuvent provoquer des remontées soudaines et massives de thrips dans les arbres. **Ces remontées peuvent être particulièrement préjudiciables dans les 15 à 20 jours précédant la récolte.**



# CERISIER

## • MALADIES DU FEUILLAGE – *Cylindrosporium padi* ET *Coryneum beijerinckii*

**Situation :** lors des observations réalisées le 17 août, 3 parcelles étaient concernées par la présence de cylindrosporiose (entre 1 et 20% des feuilles touchées et entre 20 et 100% des arbres concernés).

**Analyse de risque :** concernant la cylindrosporiose, il existe un risque de contaminations secondaires jusqu'en août dans les parcelles présentant des taches sur feuilles, à l'occasion des pluies. Des contaminations dues au *coryneum* peuvent se produire sur pousses en cas de longue période d'humectation.

**Les prévisions météorologiques humides de cette fin de semaine seront favorables à la maladie.**

## • GNOMONIA – *Gnomonia erythrostoma*

**Biologie :** Cette maladie peut se développer dans certains secteurs (Ardèche, Rhône) lors des printemps aux conditions humides. Les spores sont conservées dans des périthèces pendant l'hiver dans les feuilles infestées restées au sol. Ensuite, elles sont libérées à l'occasion des pluies d'avril à fin mai et infectent les jeunes feuilles. Dès le mois de mai, les symptômes (taches diffuses jaunâtres puis brunes) peuvent apparaître sur les jeunes feuilles des bouquets de mai et de la base des rameaux. À la face inférieure des feuilles se forment de minuscules cratères noirs renfermant les conidies qui entraîneront les contaminations secondaires pendant l'été, et de nouveaux symptômes sur feuilles (taches arrondies brun-rougeâtres) et en cas de fortes attaques sur fruits (taches violacées, chair liégeuse et amère).

**Analyse de risque :** Les prévisions météorologiques humides de cette fin de semaine seront favorables à la maladie.



# POMMIER- POIRIER

## • MALADIES DE CONSERVATION

Les principaux champignons responsables de ces pathologies sont des parasites latents (champignons pénétrant dans les fruits par des portes d'entrée naturelles), ou des parasites de blessures.

**Les parasites latents :** ces champignons pénètrent par les lenticelles, l'œil, le pédoncule. Ils se développent après un temps de latence plus ou moins long. La contamination se fait essentiellement en verger à la faveur des pluies qui disséminent les spores.

- **Le *Gloesporium*** est présent sous forme de petits chancre sur les rameaux. Les spores sont disséminées à la surface des fruits sous l'action de la pluie et pénètrent dans les lenticelles. Sur fruits, ce champignon occasionne des pourritures brunes circulaires autour des lenticelles infectées.

- **Le chancre commun (*Cylindrocarpon mali*)** est la forme asexuée de *Nectria galligena*. Lorsqu'il existe des chancres dans le verger, les fruits peuvent être contaminés. Ce champignon entraîne une pourriture sèche au niveau de l'œil en verger et une pourriture lenticellaire en conservation.

- **Le phytophthora (*Phytophthora cactorum*)** est un champignon qui se conserve dans le sol. Les fruits tombés ou ceux qui sont sur les branches basses sont les premiers à être contaminés. Il provoque une pourriture ferme, brune à contour diffus.

**Les parasites de blessures :** ces champignons pénètrent dans les fruits par les portes d'entrée accidentelles et ont un développement rapide. La contamination peut se faire en verger, mais aussi dans les locaux de conservation.

- **La moniliose (*Monilia fructigena*)** se caractérise par une pourriture ferme brune qui se couvre rapidement de coussinets bruns disposés en cercles concentriques. Les fruits restent souvent accrochés dans l'arbre (fruits momifiés) et constituent une source de contamination.

- **Le botrytis de l'œil (*Botrytis cinerea*)** est un champignon à la fois parasite latent et de blessure. La contamination peut avoir lieu en fin de floraison et se maintenir à l'état latent dans les organes infectés.



Les symptômes (petites lésions sèches brunes au niveau de la cavité oculaire) s'expriment en été. La contamination est également possible sur les fruits blessés. En conservation, la pourriture est brune, molle et se couvre d'un feutrage gris.

- **Le pénicillium** (*Penicillium expansum*) est une pourriture molle de forme circulaire et à contour net. Les fructifications apparaissent sous la forme d'une moisissure bleu-verdâtre. Ce champignon se conserve et se dissémine souvent à partir des pallox.

Source : BSV Arboriculture Pommier Nord Poitou Charentes n°80 du 04/08/2015



Gloeosporiose - photo CTIFL



Moniliose - photo FREDONRA



Botrytis de l'œil - photo <http://www.omafra.gov.on.ca>


**Analyse de risque :** Les maladies de conservation sont favorisées par un temps humide dans le mois précédant la récolte. **Les conditions humides et orageuses prévues en cette fin de semaine sont favorables à la maladie.** Soyez vigilants à l'évolution des conditions météorologiques pour réévaluer le risque.

**Prophylaxie :** Mettez en place des mesures prophylactiques à la récolte :

- Veillez à faire chuter et à retirer du verger les fruits atteints pour limiter les sources de contaminations.
- Manipulez avec précaution les fruits pour éviter les blessures au moment de la récolte et de la phase de conditionnement et triez à l'entrée en station.
- Supprimez tout ce qui peut entraîner des chocs lors de passages d'engins (rameaux longs).
- Éliminez les fruits trop près du sol (risque *phytophthora*).
- Évitez de cueillir en conditions pluvieuses.
- Utilisez des emballages propres.
- Ne laissez pas séjourner dehors les palox et caisses récoltées.

## • CARPOCAPSES DES POMMES ET DES POIRES – *Cydia pomonella*

**Situation :** Les prises sont en diminution par rapport aux semaines précédentes. **Le deuxième vol approche de la fin en Rhône-Loire et en Savoie-Haute-Savoie. Il est terminé en Moyenne Vallée du Rhône, et un troisième vol a débuté.**



Résultats des suivis de CARPOCAPSE DES POMMES du 17/08/2020 sur pommier						
Secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
MVR	7	3	4	0	0	0
RL	5	3	2	0	0	0
S-HS	1	1	0	0	0	0

Résultats des suivis de CARPOCAPSE DES POMMES du 17/08/2020 sur poirier						
Secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
MVR	1	0	1	0	0	0
RL	2	1	1	0	0	0
S-HS	1	1	0	0	0	0

### Prévisions du modèle et analyse de risque :

Pourcentage d'avancement estimé par le modèle au 18/08/2020				
Secteur	Zone	Adulte Carpopapse	Pontes de Carpopapse en G2	Eclosions de Carpopapse en G2
MVR	Zone précoce	100 %	100 %	100 %
	Zone moyenne	100 %	100 %	100 %
	Zone tardive	100 %	100 %	99 %
RL	Zone précoce	100 %	99 %	97 %
	Zone moyenne	99 %	97 %	93 %
	Zone tardive	98 %	95 %	83 %

En Moyenne Vallée du Rhône : la période d'éclosions de la G2 est terminée. **D'après le modèle, un troisième vol serait en cours depuis le 1er août en zones précoces, depuis le 8 août en zones moyennes et depuis le 10 août en zones tardives.**

En Rhône-Loire : la période de ponte est terminée depuis le 13 août en zones précoces. Elle s'arrêtera le 19/08 en zones moyennes et le 20/08 en zones tardives. La période d'éclosion est en cours en toutes zones. Elle s'achèvera le 20/08 en zones précoces, le 26/08 en zones moyennes et le 29/08 en zones tardives. **D'après le modèle, un troisième vol devrait débuter à partir du 24 août en zones précoces.**

En Savoie/Haute-Savoie : la période de ponte s'arrêtera le 18/08 en zones précoces et le 22/08 en zones tardives. La période d'éclosion est toujours en cours en toutes zones. Elle s'achèvera le 25/08 en zones précoces et le 31/08 en zones tardives.



**Méthode alternative :** Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service DGAL/SDQSPV/2020-110 en cliquant sur le lien :

<http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>

## • TORDEUSES DE LA PELURE – CAPUA et PANDEMIS

**Situation :** des captures de Capua et de Pandemis ont été observées sur 3 parcelles de Moyenne Vallée du Rhône le 17/08 (de 1 à 18 individus par piège). Des dégâts ont été observés sur fruits sur une parcelle de Savoie-Haute-Savoie à l'approche de la récolte (4% des fruits touchés).

**Analyse de risque :** Le risque de dégâts est faible actuellement.



**Ne pas confondre :** attention à ne pas confondre les adultes *Pandemis* avec la tordeuse de l'œillet actuellement bien visible dans les pièges (aux ailes postérieures orange vif, papillon plus petit).




Photo FREDON AURA

## • PETITE TORDEUSE DES FRUITS – *Cydia lobarzewskii*

**Situation :** Le vol de la petite tordeuse des fruits est terminé. Aucune capture n'a été réalisée lors des observations du 17 août.

**Analyse de risque :** Ce ravageur peut être problématique certaines années, en particulier dans les parcelles en confusion carcopapse. Actuellement, les conditions sont favorables à l'observation des dégâts car les éclosions sont toujours en cours. Soyez vigilants.

## • FEU BACTÉRIEN - *Erwinia amylovora*

**Biologie :** L'hôte principal de la bactérie *Erwinia Amylovora*, est le poirier, mais elle s'attaque également au pommier, au cognassier et à plusieurs espèces ornementales (cotonéasters, pyracantha, stranvaesia, chaenomeles...). La bactérie contamine l'arbre ou la plante essentiellement par la fleur mais aussi par l'extrémité des pousses en croissance, par des ouvertures naturelles ou des blessures. La bactérie progresse dans les rameaux puis les branches fruitières, les charpentières, et passe dans le tronc et le système racinaire. Sur les parties atteintes, les feuilles brunissent (poirier) ou roussissent (pommier), et prennent un aspect brûlé. **Ces bactéries sont disséminées par l'eau, le vent, les insectes, l'homme, ... *Erwinia amylovora* atteint son développement optimum vers 24-27°C.**

**Situation :** La maladie est visible en tous secteurs, sans nouveau signalement le 17 août.

**Analyse de risque :** Les températures chaudes sont favorables à la multiplication des bactéries dans les parcelles contaminées. Soyez vigilants en cas de blessures, des contaminations peuvent se produire à l'occasion d'averses ou en cas d'aspersion prolongée.



### Prophylaxie :

- **Supprimez les symptômes le plus tôt possible après leur apparition.** Il est nécessaire de couper largement en dessous du dernier signe visible de la maladie (1 m en dessous sur poirier, et 30 cm en dessous sur pommier). Plus la vitesse de croissance est importante, plus la bactérie est active, plus cette distance doit être grande. En cas de forte attaque, l'arrachage de l'arbre entier doit être envisagé.
- Veillez à réaliser l'assainissement **par temps sec**, et à désinfecter les outils de taille.
- **Evacuez hors du verger les bois taillés** par temps sec, rapidement (dans les 24 h), et les **détruire** (brûlage).

# POMMIER

## • TAVELURE – *Venturia inaequalis*

**Situation** : Des taches sur feuilles et sur fruits sont visibles en tous secteurs. (Cf. photo dans BSV n°14 du 19/05/20). Le 17 août, une parcelle de pommiers de Rhône-Loire présentait des dégâts sur 0,5% des pousses.

**Analyse de risque** : Des contaminations secondaires peuvent se produire à partir des conidies issues des taches sur feuilles, à l'occasion des pluies (tenir compte également des irrigations, notamment par aspersion sur frondaison). Le risque peut être important du fait des conditions orageuses annoncées en fin de semaine.

Le tableau ci-dessous présente les risques d'infection sur fruits sur variétés sensibles suivant la durée d'humectation pour différentes températures :

T° moyenne pendant l'humectation	10°C	15°C	20°C	25°C
Juillet	35 h	23 h	17 h	14 h
Août	45 h	30 h	22 h	18 h

 **Méthode alternative** : Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service DGAL/SDQSPV/2020-110 en cliquant sur le lien : <http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>

## • MALADIE DU FEUILLAGE - ALTERNARIOSE

**Situation** : Aucun nouveau signalement n'a été fait lors des observations du 17/08.

## • PUCERONS LANIGÈRES – *Eriosoma lanigerum*

**Situation** : des foyers sur pousses de l'année, parfois importants, sont toujours visibles sur certaines parcelles de Moyenne Vallée du Rhône et Savoie-Haute-Savoie.

**Analyse de risque** : Le risque de développement des foyers sera faible cette semaine. Les pucerons lanigères devraient être fragilisés par les fortes températures.



## • ACARIEN ROUGE – *Panonychus ulmi*

**Situation** : Le 10 août, une parcelle de pommier en Rhône-Loire était concernée par la présence faible de formes mobiles d'acariens rouges avec 10 % de feuilles occupées.

**Analyse de risque** : Le risque d'éclosions restera élevé cette semaine compte-tenu des conditions chaudes très favorables aux acariens. Soyez vigilants en particulier dans les parcelles concernées par plus de 60 % de bourgeons occupés avec plus de 10 œufs d'hiver lors des observations hivernales.



**Seuil indicatif de risque** : 50 % de feuilles occupées par au moins une forme mobile (80% en présence de Typhlodromes).

**Auxiliaires :** Pensez à observer les Typhlodromes, ces auxiliaires peuvent permettre de réguler les populations en conditions favorables. Ils sont reconnaissables par leur corps en forme de poire, et leur aspect jaune pâle brillant. Ces sont des acariens très mobiles, plus rapides que les acariens rouges. Ne pas les confondre avec les Tydéides dont le corps est, à l'inverse de celui des Typhlodromes, plus large à l'avant qu'à l'arrière

## • COUPS DE SOLEIL

La période estivale est favorable à l'apparition de nouveaux coups de soleil sur fruits sur les rangs les plus exposés.

## POIRIER

### • TAVELURE DU POIRIER – *Venturia pirina*

**Situation :** Le 17 août, aucun dégât n'a été observé sur les parcelles à l'approche de la récolte.

**Analyse de risque :** Des contaminations secondaires peuvent se produire à l'occasion des pluies à partir des conidies issues des taches formées pendant la période de contaminations primaires ou bien également à partir des chancres sur rameau. Les conditions orageuses prévues pour la fin de semaine sont favorables à la maladie.

### • PSYLLE DU POIRIER – *Cacopsylla pyri*

**Situation :** Le 17 août, la présence d'œufs de psylles du poirier a été observée sur une parcelle de Rhône-Loire sur 2% des bourgeons.

**Analyse de risque :** En cas de forte présence de larves, celles-ci vont poursuivre leur développement et plusieurs générations de psylles vont se succéder. La sécrétion de miellat des larves pourra entraîner le développement de fumagine sur le feuillage et les fruits. Soyez vigilants. Cette semaine, du fait des conditions chaudes, le risque de développement est élevé.




 **Prophylaxie :** Dans les situations de forte pression avec développement de larves et de miellat, mettre en place des aspersion sur frondaison en alternant irrigation et séchage par plage de 2 h, de façon à fragiliser les larves. Cette mesure est déconseillée sur les parcelles attaquées par le Feu Bactérien, et sur les parcelles ayant été fortement attaquées par la Tavelure ou la stemphyliose.

## NOYER

### • CARPOCAPSE DU NOYER – *Cydia pomonella*

**Situation :** Le vol de G2 est en cours mais diminue.





**Analyse de risque :** les résultats du modèle DGAL/INoki pour la vallée de l'Isère, indique qu'au 17 août, 98% du deuxième vol des adultes, 95% des pontes de G2, et 85% des éclosions de G2 ont été atteints. La période de pontes se terminera le 22 août. La période à haut risque d'éclosion est terminée depuis le 17 août. La fin des éclosions de G2 est annoncée par le modèle pour le 31 août.


Pour la zone du Diois, le modèle DGAL/INoki indique que 100% du deuxième vol des adultes, 97% des pontes de G2, et 90% des éclosions de G2 ont été atteints. La période de pontes se termine le 18 août. La période à haut risque d'éclosions est terminée depuis le 13 août. La fin des éclosions de G2 est annoncée par le modèle pour le 26/08.

## • MOUCHE DU BROU – *Rhagoletis completa*


**L'adulte est identifiable par la présence d'un point jaune caractéristique du genre *Rhagoletis* en bas du thorax, ET des ailes transparentes marquées par 3 traits noirs épais, dont le dernier est prolongé en forme de L.**

Attention à ne pas confondre l'insecte avec d'autres mouches du genre *Rhagoletis*, comme *Rhagoletis cerasi* (mouche de la cerise), *Rhagoletis meigenii* ou bien qu'elle n'ait pas encore été détectée en France : *Rhagoletis suavis*.

En cas de détection de *Rhagoletis suavis*, contactez le SRAL Rhône-Alpes ou le réseau FREDON : cette mouche s'attaque également au noyer et a été signalée en Allemagne en 2013 dans la région de Brandebourg.



***Rhagoletis completa***  
(mouche du brou de la noix)




***Rhagoletis cerasi***  
(mouche de la cerise)



***Rhagoletis suavis***

La Mouche du Brou de la Noix fait l'objet d'un suivi de 14 pièges depuis le 22 juin.

**Situation :** Aucun capture n'a été prise cette semaine dans les pièges suivis.



**Analyse de risque :** le suivi des pièges est important afin de gérer au mieux la présence du ravageur.

### • BACTÉRIOSE DU NOYER – *Xanthomonas campestris* pv. *Julandis*

**Situation :** le 17 août, la présence de la bactériose était constatée sur 4 parcelles de Moyenne Vallée du Rhône. La maladie était présente sur 2 à 4% des fruits.

**Analyse de risque :** La période de forte sensibilité du noyer à la maladie est terminée. Cependant, la bactérie reste présente sur les arbres contaminés et peut se réactiver en cas d'épisodes humides. De plus, la présence de blessures dues au vent, à une pluie violente ou à la grêle (orages) constitue un risque supplémentaire favorable à la pénétration des bactéries.

### • ANTHRACNOSE À *COLLETOTRICHUM ACUTATUM*

**Situation :** Des symptômes ont été signalés sur 2 parcelles le 17 août, avec 3 % et 6 % des fruits touchés.

**Analyse de risque :** L'incubation de *Colletotrichum* étant longue, les symptômes n'apparaissent pas au printemps mais plus tardivement en saison, c'est-à-dire en ce moment.


## CHÂTAIGNIER

### • PHÉNOLOGIE

Grossissement des bogues en cours en toutes zones.

### • TORDEUSE DES CHÂTAIGNES – *Pammene fasciana*

Fin du vol en Nord Ardèche. Taux de capture encore assez régulier en Sud-Ardèche. 5 à 10 % d'attaques sur bogues sont observés sur certaines parcelles en Ardèche.



## • CYNIPS DU CHÂTAIGNIER – *Dryocosmus kuriphilus*

Très peu de galles observées en Drôme et Ardèche, même sur les variétés très sensibles. Seules des galles sont observables sur Marigoule et Marsol quand ces variétés sont en grande quantité (faible nombre de galles observables).

## • CARPOCAPSE DES CHÂTAIGNES – *Cydia splendana*

Le vol en cours avec en moyenne 5 captures par piège en Nord-Ardèche et 7 captures en Sud-Ardèche et 13 captures en Drôme.

**Méthode alternative : La confusion doit avoir été mise en place à cette période.** Cette

technique permet d'empêcher la rencontre des mâles et des femelles par la diffusion d'un nuage de phéromones, et de limiter ainsi l'accouplement et la ponte.

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service

DGAL/SDQSPV/2020- 110 en cliquant sur le lien :

<http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>

**Des méthodes à base de bactéries existent pour lutter contre le développement des chenilles.**

## 🦋 TOUTES ESPÈCES

### • PUNAISE DIABOLIQUE – *Halyomorpha halys*

**Situation :** Des captures sur pommiers ont été observées sur 3 pièges suivis dans le réseau le 17 août avec de 1 à 6 captures. Hors réseau, des dégâts importants sont observés en Savoie/Haute-Savoie.

**Analyse de risque :** Il existe un risque élevé de piqûre des fruits dès présence d'adultes ou de larves. L'insecte est très polyphage.

Pour vous aider à identifier les punaises, consultez la fiche INRA sur le site EcophytoPIC :


<https://ecophytopic.fr/piloter/punaise-diabolique-et-autres-punaises-en-arboriculture-comment-les-reconnaitre>



Photo FREDON AURA

## • MOUCHE MEDITERRANÉENNE – *Ceratitis capitata*

**Biologie :** Cette mouche très polyphage, qui se développe habituellement dans le sud de la France, peut se déplacer sur de grandes distances, et être rencontrée certaines années dans notre région, si les conditions de températures sont favorables (climat chaud et sec). Les femelles pondent leurs œufs sous l'épiderme des fruits par paquets. Les œufs éclosent 2 à 4 jours après pour des températures chaudes et 16-18 jours pour des températures fraîches. Le cycle larvaire dure 1 à 2 semaines. À maturité, les larves quittent les fruits et se nymphosent dans le sol. Les adultes émergent une à plusieurs semaines après selon les températures. A noter : le climat de Rhône-Alpes ne permet pas à la mouche d'hiverner d'une année sur l'autre.



Source : <http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Mouche-mediterranenne-des-fruits>

**Situation :** Un suivi de 8 pièges a débuté dans le réseau sur des parcelles de pêchers et de pommiers. 2 captures ont été enregistrées sur une parcelle de pommiers de Moyenne Vallée du Rhône le 17/08.

## • CICADELLE PRUINEUSE – *Metcalfa pruinosa*

**Situation :** La présence de la cicadelle pruineuse a été observée sur 3 parcelles en Moyenne Vallée du Rhône, Rhône-Loire et Savoie-Haute-Savoie lors des observations du 17/08.

**Analyse de risque :** les conditions chaudes et sèches sont favorables au développement de l'insecte. Les larves occasionnent des dégâts par la sécrétion de miellat entraînant le développement de fumagine. A surveiller pendant l'été.



## • AMBROISIE – *Ambrosia artemisiifolia*

Les pollens d'ambrosie, émis majoritairement en août-septembre, provoquent de fortes réactions allergiques (rhinite, conjonctivite, asthme...) chez les personnes sensibles.

**Actuellement, l'ambrosie est en floraison.**

Ces affections peuvent toucher n'importe quel individu, notamment en cas d'exposition intense, répétée ou prolongée. En 2019, un tiers des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont eu des signalements d'ambrosie sur leur territoire (source: plateforme «Signalement ambrosie»). Contrôler la présence d'ambrosie chaque année, avant sa floraison, c'est agir pour la santé de tous !

Les secteurs agricoles sont fortement impactés par l'ambrosie, il est nécessaire d'agir pour restreindre sa progression sur le territoire. Une plaquette est disponible, à destination notamment des agriculteurs et des partenaires techniques, et reprend les principaux leviers de lutte préventive et curative à mobiliser pour maîtriser efficacement contre l'ambrosie en milieu agricole :

- Les éléments de reconnaissance de l'ambrosie ;
- La lutte en culture;
- La lutte en interculture;
- Le nettoyage des engins agricoles.



Ambrosie en floraison  
Photo FREDON AURA

Document disponible sur [ambrosie.fredon-aura.fr](http://ambrosie.fredon-aura.fr) - rubrique documentation.

Voir également : [https://ambrosie.fredon-aura.fr/images/PDF/2005\\_Infos\\_ambrosie.pdf](https://ambrosie.fredon-aura.fr/images/PDF/2005_Infos_ambrosie.pdf)

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.  
<http://arboriculture.ecophytopic.fr/arboriculture>

*Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation*

**Directeur de publication** : Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

**Coordonnées du référent** : Cécile BOIS – [cecile.bois@aura.chambagri.fr](mailto:cecile.bois@aura.chambagri.fr)

**Animateur filière/Rédacteur** : Anne-Lise CHAUSSABEL - [anne-lise.chaussabel@drome.chambagri.fr](mailto:anne-lise.chaussabel@drome.chambagri.fr) / Tony COUANON – [tony.couanon@fredon-aura.fr](mailto:tony.couanon@fredon-aura.fr)

**À partir d'observations réalisées par** : les Chambres d'Agriculture de la Drôme, de l'Ardèche, du Rhône, de l'Isère, et Savoie/Mont-Blanc, Cooptain, Coopérative du Pilat, Naturapro, Ets Payre, Ets Bernard, Vignolis, Groupe Oxane, Lorifruit, Valsoleil, Inovappro, FREDON Auvergne-Rhône-Alpes (Sites St Priest, Drôme, Ardèche, Isère, Savoie/Haute-Savoie), ADABIO, Verger Expérimental de Poisy, Coopénoix, SENURA, SEFRA, SICOLY.

*Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tout autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.*

*Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.*

